

Recommandations françaises actuelles concernant les différents vaccins contre l'infection par le VZV

Vaccination contre la varicelle (but : éviter la primo-infection par le VZV)

VARIVAX® (MSD France)

Vaccin vivant atténué
Souche vOka (≥ 1 350 UFP)
Sans adjuvant
Schéma vaccinal : 2 doses



VARILRIX® (GlaxoSmithKline)

Vaccin vivant atténué
Souche vOka (≥ 1 995 UFP)
Sans adjuvant
Schéma vaccinal : 2 doses

Recommandations (calendrier vaccinal 2023)

- Les adolescents âgés de 12 à 18 ans n'ayant pas d'antécédent clinique de varicelle ou dont l'histoire est douteuse.
- Les femmes en âge de procréer, notamment celles ayant un projet de grossesse, et sans antécédent clinique de varicelle.
- Les femmes n'ayant pas d'antécédent clinique de varicelle (ou dont l'histoire est douteuse) dans les suites d'une première grossesse.
- Toute personne sans antécédent de varicelle (ou dont l'histoire est douteuse) et dont la sérologie est négative, en contact étroit avec des personnes immunodéprimées.
- Les personnes en attente de greffe, dans les 6 mois précédant une greffe d'organe solide, sans antécédent de varicelle (ou dont l'histoire est douteuse) et dont la sérologie est négative.
- Les professionnels en contact avec la petite enfance (crèches et collectivités d'enfants notamment).
- Les professions de santé en formation (à l'entrée en première année des études médicales ou paramédicales), à l'embauche ou à défaut, déjà en poste, en priorité dans les services accueillant des sujets à risque de varicelle grave (immunodéprimés, services de gynéco-obstétrique, néonatalogie, pédiatrie, maladies infectieuses, néphrologie).
- La vaccination est recommandée dans les 3 jours suivant un contact avec un cas de varicelle ou de zona pour toute personne immunocompétente de plus de 12 ans (à l'exclusion des femmes enceintes), sans antécédents de varicelle et de vaccination contre la varicelle.

Contre-indications

Hypersensibilité
Grossesse
Immunodépression

Vaccination contre le zona (but : éviter la réactivation du VZV)

ZOSTAVAX® (MSD France)

Vaccin vivant atténué
Souche vOka (≥ 19 400 UFP)
Sans adjuvant
Schéma vaccinal : 1 dose



SHINGRIX® (GlaxoSmithKline)

Vaccin inactivé
Glycoprotéine E recombinante (50 µg)
Avec adjuvant
Schéma vaccinal : 2 doses

Recommandations (calendrier vaccinal 2023)

- Les adultes âgés de 65 à 74 ans révolus y compris ceux ayant déjà présenté un ou plusieurs épisodes de zona.

Contre-indications

Hypersensibilité
Immunodépression

Recommandations (Haute autorité de santé 2024)

- Les adultes immunocompétents âgés de 65 ans et plus.
- Les adultes immunodéprimés âgés de 18 ans et plus.

Contre-indication

Hypersensibilité

UFP : unités formant plages ; vOka : souche vaccinale Oka de VZV