


PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES



- Indiquées dans certaines situations, en complément des précautions standard (qui restent indispensables)
- Doivent faire l'objet d'une prescription médicale
- Doivent être adaptées au mode de transmission de l'agent infectieux en cause

	PRÉCAUTIONS « GOUTTELETTES »	PRECAUTIONS « AIR »	PRÉCAUTIONS CONTACT	PRÉCAUTIONS CONTACT SPÉCIFIQUES
	SARS-CoV-2, grippe, VRS, rubéole, oreillons, <i>parvovirus B19</i> et autres virus respiratoires, mycoplasme, coqueluche, méningocoque, streptocoque A	Exclusivement : tuberculose laryngée ou pulmonaire, rougeole, varicelle	Colonisation ou infection à BMR, BHRe, Varicelle, infections entériques (entérovirus...), VRS	<i>Clostridioides difficile</i> Ectoparasites (gale...)
Chambre individuelle	Oui	Oui	Oui	Oui
Hygiène mains	Précautions standard : friction hydro-alcoolique			Savon puis friction hydro- alcoolique après le soin
Masque soignants	Masque chirurgical (Appareil de protection respiratoire FFP2 si soin aérosolisant)	Appareil de protection respiratoire FFP2 avant entrée dans la chambre	Précautions standard = masque chirurgical si soin à risque de projection ou aérosolisation ou si toux supposée infectieuse chez le soignant	
Masque patient	Masque chirurgical		Non	Non
Gants	Précautions standard			Dès l'entrée dans la chambre Changés aussi souvent que nécessaire
Protection tenue	Précautions standard		<u>Pour tout soin direct auprès du patient :</u> Tablier plastique sans manches à usage unique	<u>Dès entrée dans la chambre :</u> Surblouse manches longues UU Si soin mouillant : ajouter tablier plastique
Surfaces, linge	Précautions standard			Désinfectant sporicide pour les surfaces pour <i>C. difficile</i> (ex. eau de javel) Traitement spécifique des textiles pour la gale

- **Isolement protecteur**

But : chez les patients fortement immunodéprimés, limiter le risque infectieux d'origine exogène en particulier le risque d'origine environnemental (ex. risque aspergillaire).

Mesures à moduler en fonction du niveau de risque du patient :

- Neutropénie de courte durée : respect strict des précautions standard, port systématique de masque chirurgical par les soignants et visiteurs.

- Neutropénie profonde et prolongée : combinaison de mesures (règles de circulation, traitement de l'air, alimentation contrôlée, tenue adaptée pour les soignants et visiteurs).

Auteurs	Pierre Frange et Solen Kernéis
Relectrices	Chloé Dupont et Anne-Marie Rogues

Légende *Rang A* *Rang B* *Rang C*

Cette fiche a été rédigée par les enseignants de bactériologie-virologie-hygiène des facultés de médecine de France
Elle est la propriété du groupe AZAY de la Société Française de Microbiologie (SFM)
Toute reproduction ou utilisation hors contexte d'enseignement académique est interdite