

Dépistage du cancer du col de l'utérus

Rédaction : Eric Farfour - Comité scientifique : Hélène Pere,



1 Qui est concerné ?

Toutes les femmes âgées de 25 à 65 ans

2 Que dépiste-t-on et par quel moyen ?

a L'infection par un papillomavirus

- Le papillomavirus (HPV) est responsable du cancer du col de l'utérus
- C'est une infection sexuellement transmissible très fréquente et qui ne provoque pas de symptôme
- Elle guérit spontanément dans la plupart des cas
- Dans quelques cas, le virus peut persister dans les cellules et après plusieurs années provoquer un cancer

→ Par un test HPV

Cet examen de laboratoire recherche l'ADN des papillomavirus responsable du cancer

b Le cancer du col de l'utérus & les lésions précancéreuses du col de l'utérus

- En France 3 100 cancers du col de l'utérus et 30 000 lésions précancéreuses sont diagnostiqués chaque année
- Les lésions précancéreuses correspondent au stade précédent le cancer

→ Par un examen cytologique du frottis
Cet examen recherche les cellules cancéreuses et précancéreuses

Test HPV et examen du frottis sont réalisés sur un même prélèvement cervico-vaginal

3 En pratique ?

a Entre 25 ans et 30 ans

Le dépistage repose sur un 1er frottis répété 1 an plus tard, puis après 3 ans



b Entre 30 ans et 65 ans

Le dépistage repose sur un test HPV répété tous les 5 ans s'il est négatif

