

PREVENTION DE LA BRONCHIOлите DU NOURRISSON : VACCIN & ANTICORPS

Rédaction : E. Farfour - **Comité scientifique :** D. Boutolleau, S. Burrel, C. Bressollette-Bodin, A. Damour, S. Fourati, J. Le Goff, S. Larrat, G. Ligat, M. Salmona, V. Thibault, C. Vauloup Fellous



1 La Bronchiolite en quelques chiffres



- La bronchiolite est due à des virus dont le virus respiratoire syncytial (VRS ou RSV) dans plus de 80% des cas.
- Environ 30% des nourrissons de moins de 2 ans font une bronchiolite chaque année.
- La bronchiolite est responsable de 45 000 hospitalisations chez les nourrissons chaque année

2 La prévention, pourquoi ?



- Réduire le risque de forme sévère et d'hospitalisation de votre nourrisson.
- Elle concerne tous les nourrissons. En effet, tous les nourrissons peuvent faire une bronchiolite sévère, y compris ceux en bonne santé.

3 Comment ? Deux stratégies alternatives au choix

Vaccination pendant la grossesse



- Pour qui ? Femmes enceintes entre 32 et 36 semaines d'aménorrhée (SA) pendant la période de la campagne.
- Comment ça fonctionne ? Le vaccin stimule la production maternelle d'anticorps et augmente la quantité d'anticorps transmis au fœtus. Les anticorps sont transmis au fœtus et vont protéger le nouveau-né à sa naissance. Il est donc important de se vacciner au plus tôt dès 32 SA. En effet, pour que le vaccin soit efficace, il faut un intervalle d'au moins 2 semaines entre la vaccination et l'accouchement. Si l'accouchement survient avant, il est recommandé d'administrer des anticorps monoclonaux au nourrisson.

Administration d'anticorps monoclonaux au nourrisson



- Pour qui ? Pour tous les nourrissons de moins d'un an, nés pendant la campagne de prévention. Les nourrissons vulnérables âgés d'un à deux ans pendant la période de la campagne sont également éligibles.
- Comment ça fonctionne ? Des anticorps neutralisant le RSV sont directement administrés au nourrisson.

? Quelle stratégie choisir ? Ces deux stratégies présentent la même efficacité : elles réduisent d'environ 80 % le risque de forme grave de bronchiolite chez le nourrisson. Elles offrent une protection durant les 5 à 6 premiers mois de vie, qui correspondent à la période la plus à risque de formes sévères. Demandez conseil à votre médecin ou votre sage-femme.

4 En pratique



- La campagne d'immunisation couvre la période de circulation du RSV et dépend de la zone géographique
- Les 2 stratégies sont prises en charge par la sécurité sociale

Territoires	Dates de la campagne
Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy	31 août 2026 - 28 février 2027
Métropole	14 septembre 2026 - 28 février 2027
La Réunion	28 septembre 2026 - 28 mars 2027
Mayotte	1er octobre 2026 - 31 mai 2027
Guyane	Toute l'année